

# CABINET DE MÉDECINE GÉNÉRALE DU HAUT PERLIC

Docteur Camille  
JUNGMANN

Docteur Charlotte  
LABRUNE

Docteur Chantal MANUEL  
DE CONDINGUY

Docteur Laurent  
MAGOT

## Votre médecin suspecte une gale

La gale est causée par un parasite se logeant dans la peau et provoquant des démangeaisons intenses.

La gale peut atteindre toutes les personnes quel que soit leur âge. Elle est contagieuse et se transmet par contact prolongé avec une personne atteinte. La transmission par le biais de vêtements ou de linges hébergeant le parasite est plus rare mais possible.

### Le traitement de la gale repose:

- Soit sur un traitement oral en une seule dose d'ivermectine (STROMECTOL®) pour les patients pesant plus de 15 Kg.
- Soit sur un traitement local par badigeonnage de l'ensemble du corps.

L'efficacité du traitement survient au 3<sup>ème</sup> jour, mais **les démangeaisons peuvent se poursuivre jusqu'à 10 jours après le traitement.**

Si de nouvelles lésions apparaissent plus de 3 jours après traitement une nouvelle consultation est conseillée.

### Prévention de la transmission



**Se laver souvent les mains à l'eau et au savon.**

Les solutions hydroalcooliques sont à éviter car elles sont inactives sur le parasite.

### **Désinfecter le linge**

Le parasite ne vit que 48 à 72 heures hors de la peau. Tout ce que vous n'avez pas touché depuis une semaine est sain : une désinfection générale est inutile.

Se procurer de grands sacs plastiques (Sac poubelle 100 litres) et des gants plastiques à usage unique et acheter en pharmacie du spray A-PAR®.



Préparer pour chaque personne du foyer:

- vêtements propres (n'ayant pas été utilisés depuis 10 jours) pour la journée.
- pyjamas propres (n'ayant pas été utilisés depuis 10 jours) pour le soir.
- draps propres (n'ayant pas été utilisés depuis 10 jours) pour le soir.

**Laver en machine à 60°C ce qui a été utilisé depuis 10 jours** (linge, draps, dessus de lit ...).

**Pour ce qui ne peut pas être lavé à 60°C et a été utilisé depuis 10 jours** (couvertures, gants, chaussures...)

- Mettre les effets dans un sac plastique (sac poubelle 100 litres).
- Éloigner les personnes asthmatiques
- Pulvériser avec le spray A-PAR® tous les effets.
- Fermer hermétiquement le sac et laisser agir pendant environ une demi-journée (10h00).

**Pour tout ce qui ne peut pas se laver ou se mettre en sac plastique (litterie, canapé, télécommande, sièges de voiture...)**

- Éloigner les personnes asthmatiques.
- Pulvériser avec le spray A-PAR®.
- Laisser agir pendant 10 heures à 12 heures



### **Éviction scolaire**

Votre enfant ne peut aller à l'école, il ne peut y retourner que 3 jours après le début du traitement que 3 jours après le début du traitement.